

Ficha técnica

BIOPOLIGEN[®] Q



La evolución de la salud animal

BIOPOLIGEN® Q

ACCIÓN

Prevención del Síndrome Respiratorio bovino (Complejo respiratorio bovino / Fiebre del transporte / neumonía) y prevención de la Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina.

COMPOSICIÓN POR DOSIS

Vacuna conteniendo cepas inactivadas de:

- Herpesvirus bovino 1 (BoHV-1) ($\geq 1,0 \times 10^7$ DICT₅₀).
- Virus de la diarrea viral bovina 1 (DVB-1) ($\geq 2,0 \times 10^6$ DICT₅₀).
- Virus de parainfluenza bovina 3 (PI3) ($\geq 1,0 \times 10^7$ HADS).
- *Pasteurella multocida* tipo A ($\geq 2,5 \times 10^9$ bacterias).
- *Mannheimia haemolytica* ($\geq 1,3 \times 10^9$ bacterias).
- *Histophilus somni* ($\geq 2,5 \times 10^9$ bacterias).
- *Moraxella bovis* ($\geq 5,0 \times 10^7$ bacterias).
- Gel de Hidróxido de aluminio.
- Excipientes c.s.p 5 ml.

ESPECIE

Bovino.



BIOPOLIGEN® Q

INDICACIONES

Vacuna para la prevención del Síndrome Respiratorio bovino (Complejo respiratorio bovino / Fiebre del transporte / neumonía) asociado a la acción individual o combinada de los virus y bacterias presentes en la composición.

Vacuna para la prevención de la Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

5 ml. Vía subcutánea en tabla del cuello o detrás de la paleta.

PLAN DE INMUNIZACIÓN

Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Terneros de destete convencional (primovacunación): Primera dosis: 45 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

Terneros de destete precoz: Primera dosis: 30 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

Animales transportados (primovacunación): Primera dosis: 45 días antes del transporte. Segunda dosis: 15 días antes del transporte.

Animales transportados (revacunación): 15 días antes del transporte.

Animales que ingresan a invernada o feedlot: Vacunar al ingreso; si no tienen antecedentes de vacunación previa, revacunar a los 15-21 días.

Vacas y vaquillonas gestantes: Primera dosis: 60 días antes del parto. Segunda dosis: 30 días antes del parto



BIOPOLIGEN® Q

RECOMENDACIONES

Este producto debe aplicarse bajo prescripción y control del Médico Veterinario. En algunos animales, puede observarse una tumefacción en el punto de inyección que desaparece en un breve lapso sin necesidad de medicación alguna.

En animales sensibilizados, cualquier producto inyectable puede producir en forma esporádica reacciones alérgicas. Ante la presentación de síntomas como disnea, temblores, incoordinación, babeo, edema, utilizar adrenalina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

Agitar antes de usar. Una vez abierto el envase usar todo el contenido. Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

CONSERVACIÓN

Mantener entre 2°C y 8°C al resguardo de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN

100 ml (20 dosis) y 250 ml (50 dosis).

